FAUCIL

50 % de Linuron

Présentation du produit

- **Nom Commercial** : FAUCIL
- **Classe du produit** : Herbicide Anti-dicotylédone
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : E11-9-009
- **Type de formulation** : Poudre mouillable (WP).
- **Composition chimique :** 50% de Linuron

Mode d'action : Le Linuron appartient au groupe des urées substituées. Il agit par contact mais il est absorbé également par les racines des mauvaises herbes levées ou en train de germer. Il inhibe la photosynthèse des plantes sensibles. Grâce à sa persistance d'action, les mauvaises herbes levant justes. Après traitement sont aussi touchées

Efficacité

Culture	Cible	Dose (L/Ha)
Carotte	Adventices Dicotylédones	1-2 kg/ha
Céleri-pomme	Adventices Dicotylédones	2 - 3 kg/ha
Oignons plantés	Adventices Dicotylédones	2 - 3 kg/ha
Poireau planté	Adventices Dicotylédones	1,5 kg/ha
Fenouil	Adventices Dicotylédones	1,5 kg/ha
Pomme de terre	Adventices Dicotylédones	1,5 - 2 kg/ha

Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi :** FAUCIL s'applique par pulvérisation sur les adventices, à traiter avec un recouvrement total du feuillage.

- **Recommandations d'emploi & Période d'emploi :**

  Carottes : Au stade 3 feuilles des carottes. Des applications fractionnées sont conseillées : 2 – 3 x 1 kg/ha. Appliquer dès la levée jusqu'aux stades 2-4-6 feuilles des adventices.

  Céleri-pomme : 2 à 4 semaines après la plantation. Des applications fractionnées sont conseillées : 2 – 3 x 1 kg/ha. Appliquer dès la levée jusqu'aux stades 2-4-6 feuilles des adventices.

  Oignons plantés : Immédiatement après la plantation, avant la levée des adventices.

  Poireau planté : 10 - 14 jours après la plantation.

  Fenouil : En 2 applications fractionnées de 0,8 kg/ha. Pour le fenouil semé, il existe un risque de phytotoxicité.

  Pomme de terre : En pré-levée des pommes de terre.

- **Conditionnement :**